

Captan



Familia: Fungicida
 Uso: Agrícola
 Formulación: Polvo Humectable
 Registro: RSCO-FUNG-0306-368-002-050

Fungicida de la familia química Carboxamidas, es un fungicida que actúa por contacto, las Carboxamidas poseen una mejor eficacia ante los patógenos y son clave para evitar cualquier resistencia o tolerancia que puedan generar los hongos.

Características agronómicas:

CARD 50% WP es un fungicida que actúa por contacto, actúa sobre el patógeno interfiriendo en varias reacciones químicas durante la respiración del hongo, haciendo imposible para el hongo la resistencia al producto. Es un inhibidor multisitio del proceso de respiración.

Composición Porcentual:

INGREDIENTES ACTIVOS	% EN PESO
CAPTAN: N-(triclorometiltio)ciclohex-4eno-1,2-dicarboximida. (Equivalente a 500 g de i.a./kg a 20 °C).....	NO MENOS DE: 50.00%
INGREDIENTES INERTES Dispersante, humectante y vehículo.....	NO MÁS DE: 50.00%
TOTAL: 100%	

Usos:

CARD 50% WP es recomendado para el control de enfermedades en los cultivos que a continuación se mencionan. No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones.

"Antes de usar este producto, por favor lea la información de la etiqueta".

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES	INTERVALO DE SEGURIDAD
Ajo, cebolla	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	2.5 – 3.0 kg/ha	Realizar una aplicación cuando se observen los primeros síntomas a intervalos de 7 días.	Sin límite
Berenjena	Antracnosis (<i>Colletotrichum phomoides</i>)	2 – 3 kg/ha		Sin límite
Calabacita, Melón, Pepino, Sandía.	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)	2 – 3 kg/ha		Sin límite
Chile	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>)	2 – 3 kg/ha		Sin límite
Fresa	Peca de la hoja (<i>Mycosphaerella fragariae</i>) Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	3 – 4 kg/ha	Aplicar al inicio de la brotación y formación de los frutos a intervalos de 7 días.	Sin límite
Jitomate	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 – 5.0 kg/ha	Realizar 4 aplicaciones a intervalos de 7 días.	Sin límite
	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum phomoides</i>)	1.5 – 3.0 kg/ha		
Manzano	Roña (<i>Venturia inaequalis</i>)	200 – 250 g/100 L de agua	Realizar una aplicación con la floración tardía y 2 aplicaciones en precosecha.	Sin límite
Ornamentales	Mancha foliar (<i>Mycosphaerella spp.</i>) Mancha negra (<i>Diplocarpon rosae</i>)	250 g/100 L de agua	Realizar una aplicación cuando se observen los primeros síntomas a intervalos de 7-14 días.	Sin límite
Vid	Mildiu (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 – 250 g/100 L de agua	Realizar 2 aplicaciones antes de la floración.	Sin límite
Zanahoria	Tizón foliar (<i>Cercospora carotae</i>)	4 kg/ha	Realizar una aplicación cuando se observen los primeros síntomas a intervalos de 7 días.	Sin límite

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas de aplicado el producto.

Intervalo de seguridad = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Formas de aplicación:

Con el equipo de protección puesto; abra cuidadosamente la bolsa apoyándose de unas tijeras. Vierta lentamente la cantidad recomendada de **CARD 50% WP** en el tanque de aspersión con agua hasta la mitad de su capacidad, agitar continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione la cantidad de agua restante para completar la capacidad de tanque y aplique de inmediato. Cada vez que se cargue la aspersora deberá agitarse antes la mezcla preparada. Aplicar el producto con suficiente agua (700 L/ha) para obtener una cobertura completa del cultivo.

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

Almacenamiento y seguridad:

Utilice overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.

Fecha de revisión: 03/05/2021



Importante:

La información contenida en este documento es correcta según nuestros conocimientos actuales. Insecticidas del Pacífico S.A. de C.V. no incurre en responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o integridad de dicha información, a menos que señale explícitamente como garantizada. No se acepta responsabilidad explícita o implícita por la seguridad, aptitud del producto para un propósito en particular o los resultados obtenidos de su uso. El comprador y usuario asume los riesgos y responsabilidades por todos y cada uno de los perjuicios (incluso muerte), pérdidas o daños a personas y propiedades, derivados del uso de este producto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuenciales.