indiapac

FICHA TÉCNICA

Tiametoxam + Lambda Cihalotrina

Familia: Insecticida

Uso: Agrícola

Formulación: Suspensión Acuosa

Registro: RSCO-INAC-0102U-0177-X347-008-22.09



COLAM es un insecticida de amplio espectro de acción, especialmente indicado para el control de larvas y adultos de insectos masticadores, picadores-chupadores y chupadores.

Características agronómicas:

Thiamethoxam actúa sobre el sistema nervioso de los insectos en la pos-sinapsis interfiriendo los receptores de acetilcolina. Lambdacyhalotrina actúa sobre el sistema nervioso central y periferal del insecto, alterando la estructura de las proteínas encargadas de regular la apertura y cierre de los canales de sodio en las membranas de las neuronas.

Composición Porcentual:

INGREDIENTES ACTIVOS

% EN PESO

TIAMETOXAM: (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,

NO MENOS DE:

3,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)amina. (Equivalente a 141 g de i.a. / L a 20 °C)......12.61%

LAMBDA CIHALOTRINA: (R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-

3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-a-ciano-

NO MENOS DE:

3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-

INGREDIENTES INERTES

Dispersante, emulsificante, encapsulante, anticongelante, espesante,

NO MÁS DE:

TOTAL: 100%

Usos:

COLAM es un insecticida químico que se recomienda para aplicación en los cultivos y para las plagas aquí indicadas.

[&]quot;Haga énfasis en el uso de equipo de protección personal".

[&]quot;Antes de usar este producto, por favor lea la información de la etiqueta".



FICHA TÉCNICA

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGA	DOSIS (ml/Ha)	OBSERVACIONES
JITOMATE, TOMATE DE CÁSCARA, CHILE, CHILE BELL, BERENJENA, PAPA.	Sin límite	Pulgón Saltador (Paratrioza cockerelli) Mosquita Blanca (Bemisia tabaci)	200 – 300	Realizar tres aspersiones al follaje a intervalo de 7 días. Volumen de aplicación 550 – 650 l de agua/ha.

Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. El tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 8 horas.

Formas de aplicación:

Siempre use el equipo de protección. Abra el envase de COLAM girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello (no use la boca para abrir este envase). Mida con probeta la dosis recomendada y diluya en agua vertiendo la dosis previamente medida. El mezclado o agitado se realiza por medio de la recirculación en el equipo de aplicación. Este material se deberá de aplicar el mismo día en que se prepara la mezcla.

Evite aplicar COLAM durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28 °C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

Almacenamiento y seguridad:

No permita la entrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 12 horas de aplicado el producto.

Evite contacto con ojos y piel, utilice equipo de protección: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.

Fecha de revisión: 03/05/2021



/!\ Importante:

La información contenida en este documento es correcta según nuestros conocimientos actuales. Insecticidas del Pacífico S.A. de C.V. no incurre en responsabilidad alguna con respeto a la exactitud o integridad de dicha información, a menos que señale explicitamente como garantizada. No se acepta responsabilidad explicita o implicita por la seguridad, aptitud del producto para un propósito en particular o los resultados obtenidos de su uso. El comprador y usuario asume los riesgos y responsabilidades por todos y cada uno de los perjuicios (incluso muerte), pérdidas o daños a personas y propiedades, derivados del uso de este producto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuenciales.