

Paraquat + Diuron



Familia: Herbicida
 Uso: Agrícola
 Formulación: Concentrado Emulsionable
 Registro: RSCO-MEZC-1229-301-008-033

DUOQUAT SC es un herbicida de contacto no selectivo que mata rápidamente la maleza y no tiene efecto residual en el suelo.

Características agronómicas:

DUOQUAT SC puede ser aplicado en cualquier época del año para el control de la maleza. Se recomienda usar la dosis alta para tratar la maleza densa o como primer tratamiento. Usar la dosis baja para las aplicaciones en sitios muy sombreados o para tratar los rebrotes. De preferencia aplicar cuando la maleza sea joven y tenga menos de 15 cm de altura.

DUOQUAT SC causará daños si se asperja sobre las plantas cultivadas. En los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos, se debe cuidar de no aplicar en la corteza inmadura del tronco o los tallos. Evite aplicar cerca de cultivos susceptibles.

Composición Porcentual:

INGREDIENTES ACTIVOS	% EN PESO
PARAQUAT "USO RESTRINGIDO": Sal dicloruro del ión 1,1'- dimetil-4,4' bipyridinio "Con un contenido del ión bipyridinio no menor de 72.4%" (Equivalente a 200 g de i.a./L a 20 0C).....	NO MENOS DE: 24.55%
DIURON: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C).....	NO MENOS DE: 8.89%
INGREDIENTES INERTES Diluyente, surfactantes, dispersante y antiespumante.....	NO MÁS DE: 66.56%
TOTAL: 100%	

Usos:

Aplique **DUOQUAT SC** contra las malezas y en las dosis recomendadas.
 Este producto no es fitotóxico en el cultivo y a las dosis recomendadas bajo las instrucciones de uso.
 No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

"Antes de usar este producto, por favor lea la información de la etiqueta"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Maíz (SL)*	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Mostacilla (<i>Sisymbrium irio</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Golondrina (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5 – 3.0	Aplicaciones dirigidas a la maleza.

*() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)		FUENTE
	Paraquat	Diuron	
Follaje del maíz	3.0	-	Environmental Protection Agency
Grano del maíz	0.1	0.1	
Rastrojo del maíz	10.0	-	
Grano del maíz dulce	0.1	0.1	
Rastrojo del maíz dulce	10.0	-	
Grano más mazorca sin vaina del maíz dulce	0.05	-	

Formas de aplicación:

Mezclar la cantidad requerida de **DUOQUAT SC** con agua limpia en el tanque del equipo de aspersión. En aspersiones terrestres utilizar de 200 a 300 litros de agua/ha. Es esencial hacer la aspersión con precisión y cubrir totalmente la maleza. Asegurarse de que las boquillas estén en buenas condiciones lo mismo que el aguilón.

No se aplique cuando el viento sea muy fuerte (más de 8 km/hr), para evitar la deriva ni a temperaturas muy altas (más de 38 °C).

Almacenamiento y seguridad:

El producto debe mantenerse en su empaque original, bajo techo, ventilado y seco; y alejado del calor y fuego directo.

Evite contacto con ojos y piel, utilice equipo de protección personal para su manejo y aplicación, como: lentes, mascarilla, guantes y botas de hule.

Fecha de revisión: 03/05/2021



Importante:

La información contenida en este documento es correcta según nuestros conocimientos actuales. Insecticidas del Pacífico S.A. de C.V. no incurre en responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o integridad de dicha información, a menos que señale explícitamente como garantizada. No se acepta responsabilidad explícita o implícita por la seguridad, aptitud del producto para un propósito en particular o los resultados obtenidos de su uso. El comprador y usuario asume los riesgos y responsabilidades por todos y cada uno de los perjuicios (incluso muerte), pérdidas o daños a personas y propiedades, derivados del uso de este producto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuenciales.